



## PÔSTER

## Pesquisa

### Uso de cigarros entre estudantes no município de Afuá, Arquipélago do Marajó

Suelane Cristina Tavares da Costa. Universidade Federal do Pará (UFPA).

suelane.tavares@yahoo.com

Gláucia Galúcio Santana. Universidade Federal do Pará (UFPA). jessicagalucio@yahoo.com.br

Alexsander da Silva Martins. Universidade Federal do Pará (UFPA). alexsander\_m@yahoo.com.br

Gláucia Caroline Silva de Oliveira. Universidade Federal do Pará (UFPA). gcoliveira@ufpa.br

Aldemir Branco de Oliveira Filho. Universidade Federal do Pará (UFPA). olivfilho@ufpa.br

**Introdução:** Mundialmente, o tabagismo é um importante problema de saúde pública. O tabagismo pertence ao grupo de transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas. A idade escolar é um momento oportuno para a realização de ações de controle do tabagismo, a maioria dos fumantes começa a usar tabaco nessa fase da vida.

**Objetivos:** Este estudo determinou a prevalência e os fatores associados à experimentação e ao consumo regular de cigarros entre estudantes do ensino médio (EEM) no município de Afuá, Arquipélago do Marajó, Norte do Brasil.

**Metodologia ou Descrição da Experiência:** Este estudo transversal foi realizado na única escola de ensino médio do município de Afuá (agosto a novembro de 2011), no qual um questionário de autopreenchimento contendo 40 perguntas foi utilizado para descrição e análise das condições sócio-demográficas, econômicas e familiares relacionadas ao uso de cigarros dos estudantes. A modelagem estatística foi realizada por regressão logística simples e múltipla acompanhada pelo teste Hosmer-Lemeshow.

**Resultados:** Dos 873 EEM em Afuá, 808 (92,55%) aceitaram participar desta pesquisa. A faixa etária foi de 14-37 anos ( $\pm 4,33$ ), sendo detectada predominância do sexo feminino (56,46%). A prevalência de experimentação e consumo regular de cigarros foi de 18,21% e 5,68%, respectivamente. A faixa etária que ocorreu o 1º fumo foi de 8-23 anos e 6-18 anos em experimentadores e consumidores, respectivamente. Entre os EEM fumantes, 69,83% fumam até cinco cigarros/dia. Os fatores associados ao consumo regular de cigarros foram: sexo masculino, repetência escolar, trabalhar esporadicamente; não participação dos pais na vida escolar; pais fumantes; amigos fumantes; a maioria dos amigos fumantes.

**Conclusão ou Hipóteses:** A prevalência de EEM fumantes no município de Afuá ainda é relativamente baixa, sendo que o consumo de cigarros inicia precocemente, a partir, principalmente, da influência de pais e amigos.

**Palavras-chave:** Afuá. Tabagismo. Epidemiologia.