



PÔSTER

Pesquisa

Uso de tabaco entre estudantes no município de Melgaço, Pará

Liviane Lima Nogueira. Universidade Federal do Pará. liviane.nogueira@bol.com.br
 José Renato do Vale Ladislau. Universidade Federal do Pará. renatoladislau@hotmail.com
 Ronald dos Santos Fonseca. Universidade Federal do Pará. ronaldskill@yahoo.com.br
 Gláucia Caroline Silva de Oliveira. Universidade Federal do Pará. gcoliveira@ufpa.br
 Aldemir Branco de Oliveira Filho. Universidade Federal do Pará. olivfilho@ufpa.br

Introdução: O tabaco é uma droga lícita largamente utilizada em todo o mundo. Atualmente, o tabagismo é a principal causa de enfermidades evitáveis e de mortes prematuras. Entre 33 e 50% dos adolescentes que experimentaram o tabaco tornaram-se consumidores regulares. Além disso, aproximadamente 90% dos adultos fumantes adquiriram o vício na adolescência.

Objetivos: Este estudo determinou a prevalência e os fatores associados à experimentação e ao consumo regular de cigarros entre estudantes do ensino médio (EEM) no município de Melgaço, Estado do Pará, Norte do Brasil.

Metodologia ou Descrição da Experiência: Este estudo transversal foi realizado na única escola de ensino médio do município de Melgaço (agosto a novembro de 2011), no qual um questionário de autopreenchimento contendo 40 perguntas foi utilizado para descrição e análise das condições sócio-demográficas, econômicas e familiares relacionadas ao hábito de usar tabaco dos estudantes. A modelagem estatística foi realizada por regressão logística simples e múltipla acompanhada pelo teste Hosmer-Lemeshow.

Resultados: Dos 935 EEM em Melgaço, 921 (98,5%) aceitaram participar desta pesquisa. A faixa etária foi de 14-29 anos ($\pm 5,13$), sendo detectada predominância do sexo feminino (60,37%). A prevalência de experimentação e uso regular de tabaco foi de 24,65% e 6,95%, respectivamente. A faixa etária que ocorreu o 1º fumo foi de 9-21 anos e 7-17 anos em experimentadores e consumidores, respectivamente. Entre os EEM fumantes, 71,88% fumam até cinco cigarros/dia. Os fatores associados ao consumo regular de cigarros foram: sexo masculino, repetência escolar, trabalhar esporadicamente; não participação dos pais na vida escolar; pais fumantes; amigos fumantes; a maioria dos amigos fumantes.

Conclusão ou Hipóteses: A prevalência de EEM fumantes no município de Melgaço ainda é relativamente baixa, sendo que o uso de tabaco inicia precocemente, a partir, principalmente, da influência de pais e amigos.

Palavras-chave: Tabaco. Melgaço. Epidemiologia.